

2020년 간호대학생 학습역량평가 모의고사

정오표

회차	문항 번호	정답		문제 및 해설 수정사항	
		기존	정정	문제 수정	해설 수정
2회차 3교시	50	④	③, ④		[해설 일부 수정] ③ 목발을 사용하기 전 대상자가 목발을 조금 더 확실하고 기술적으로 사용하기 위해서는 어깨와 상박 근육을 강화시키는 운동이 필요하다.
2회차 3교시	84	②	④		
3회차 2교시	1			[답가지 일부 수정] ① 독재적 방법 ② 허용적 방법 ③ 민주적 방법 ④ 지시적 방법 ⑤ 방임적 방법	
3회차 1교시	21				[해설만 수정] 만성신부전 대상자에게는 고칼륨혈증, 저칼슘혈증, 고인산혈증, 고마그네슘혈증, 대사성산증이 나타날 수 있다. 초기에 일시적으로 나타나는 저나트륨혈증은 수분정체로 인한 희석효과로 기인하며, 말기에는 고나트륨혈증이 되어 염분과 수분의 정체로 고혈압과 울혈성 심부전이 나타난다. 따라서 가장 옳은 것은 ①이다.
4회차 1교시	14				[해설 일부 수정] ~, 소화성 궤양 중 위궤양은 15%, 십이지장 궤양은 80% 정도로 발생하고 있다.
4회차 2교시	57				[해설 일부 수정] 지문의 프로그램은 지역사회 역량강화를 통한 건강한 마을 만들기 프로그램으로 건강마을 워크숍, 건강마을 포럼 부분에서는 주로 지역주민들이 스스로 건강문제를 발굴하고 대안을 찾을 수 있도록 하고 있어 지역주민 역량강화에 초점을 두고 있다.
4회차 2교시	86	②	②, ⑤		[②, ⑤ 중복정답]
4회차 3교시	47			[답가지 일부 수정] ① 배뇨 간격을 점차 늘리도록 한다. ② 외출해서는 가능한 수분을 제한한다. ③ 요의를 느낄 때만 배뇨를 시도하도록 한다. ④ 차, 커피, 알코올 음료를 섭취하도록 한다. ⑤ 처방에 따라 항콜린성 약물을 투여한다.	[해설 일부 수정] • 방광훈련은 과민성 방광이나 절박 요실금이 있는 대상자에게 시행한다. • 배뇨 간격을 점차로 늘려 대상자의 잦은 배뇨를 교정한다. • 방광훈련은 방광을 안정화시키며 요절박을 감소시킨다. • 배뇨 시간을 점차 늦추면 소변량이 많아지고 배뇨 간격이 길어진다. • 요의를 느끼지 않더라도 배뇨시간이 되면 화장실에 가도록 배뇨계획을 세운다. • 취침 전 수분섭취를 제한하고, 차, 커피, 알코올 음료는 야뇨를 유발할 수 있으므로 피해야 한다.