

2022년 간호대학생 학습역량평가 모의고사

정오표

회차	문항 번호	정답		문제 및 해설 수정사항	
		기존	정정	수정 전	수정 후
2회차 2교시 지역	60			[해설] 생후 6개월 영아는 표준예방접종 일정에 따라 결핵(출생 - 1개월 이내), B형 간염(출생 - 1개월 이내, 1개월, 6개월), DTaP(2, 4, 6개월), 폴리오(2, 4, 6개월), MMR(12개월), 수두(12개월) 등에 접종을 하게 된다.	[해설] 출생~만12세 어린이는 국가예방접종을 표준예방접종 일정에 따라 시행하여야 한다. 구체적으로, 결핵(출생-1개월 이내), B형 간염(출생-1개월 이내, 1개월, 6개월), DTaP(2개월, 4개월, 6개월, 15~18개월, 만4세~6세), 폴리오(2개월, 4개월, 6~18개월, 만4세~6세), b형헤모필루스인플루엔자(2개월, 4개월, 6개월, 15~18개월), MMR(12~15개월, 만4세~6세), 수두(12~15개월), A형간염(12~23개월), 일본뇌염(불활성화백신 12~23개월, 24~35개월, 만6세, 만12세; 약독화생백신 12~23개월, 24~35개월), HPV(만11~12세) 등 해당 기간 내에 각 예방접종 횟수 기준에 따라 모두 실시하여야 접종이 완료된다.
3회차 1교시 모성	98	④	②, ④ 복수 정답	[해설] 양막파열은 분만이 곧 도래했음을 알려주는 징후이며 태아 선진부의 진입이 되지 않았다면 제대탈출 가능성 및 24시간 경과 시 감염 가능성을 고려해야 한다. 태아 선진부가 진입된 경우 태아 하강정도는 0 또는 +1인데, 이 사례에서는 태아 하강 정도가 -2인 것으로 보아 태아 선진부가 진입되지 않았음을 알 수 있어 제대탈출을 먼저 확인하고 태아심음을 측정해야 한다.	[해설] 임신 중인 임부의 분비물이라면 니트라진 테스트가 가장 우선적이다. 그러나 분만 중인 산부인으로서 아두하강 정도가 -2라는 점을 고려할 때, 제대탈출의 사정을 하는 것이 우선적인 중재이다. 간호사는 제대탈출, 태아심박동 감소 등의 문제가 아님을 우선적으로 확인하고, 니트라진 테스트로 성분을 파악해도 늦지 않는다.
5회차 1교시 성인	29	③	②, ③ 복수 정답	[문제] 파킨슨병 환자에게 확인할 수 있는 증상은? ① 근육의 이완 ② 휴식 시 손 떨림 ③ 환양 제조양 떨림 ④ 넓은 보폭의 느린 걸음걸이 ⑤ 보행 시 과도한 팔의 움직임	[문제, 해설] 단어 수정 파킨슨병 환자에게 확인할 수 있는 증상은? ① 근육의 이완 ② 휴식 시 손 떨림 ③ 환약 제조양 떨림 ④ 넓은 보폭의 느린 걸음걸이 ⑤ 보행 시 과도한 팔의 움직임
5회차 2교시 아동	22			[해설] ~ 원인은 알려지지 않았지만, 혈소판 항원에 대한 항체의 생성으로 인한 자가 면역 반응인 것으로 여겨진다. 이로 인해 혈소판의 생존률이 낮아지고 혈소판 생성에 장애가 발생한다. ~	[해설] ~ 원인은 알려지지 않았지만, 혈소판 항원에 대한 항체의 생성으로 인한 자가 면역 반응인 것으로 여겨진다. 이로 인해 면역 기능이 과도하게 활성화되어 자신의 혈소판을 파괴한다. ~